



## ПОДГОТОВКА К МРТ

### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- + **За 15 мин** до исследования необходимо подойти к администратору клиники.
- + При наличии в анамнезе хирургических вмешательств с установкой в организме медицинских изделий – **ОБЯЗАТЕЛЬНО** наличие медицинской документации/выписки с указанием названия операции и наименования материала, из которых сделаны медицинские изделия (возможно, паспорт изделия), либо наличие в документации фразы «противопоказаний для МРТ-исследований нет».

**В противном случае Вам может быть отказано в проведении исследования**

- + Предоставить результаты, диски (или ссылки) с предыдущими исследованиями КТ/МРТ/УЗИ (особенно, касающиеся исследуемой области).
- + Перед исследованием необходимо снять все металлические предметы:
  - Украшения, часы, очки, ремни, пирсинг, заколки и прочее;
  - Зубные протезы, слуховые аппараты;
  - Инъекционные устройства: инсулиновые помпы, автоматические инъекторы;
  - Одежду с металлическими вставками, молниями, крючками.

### АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ:

- + Несовместимые с МРТ кардиостимулятор, ICD (имплантируемый кардиовертер дефибриллятор), нейростимулятор;
- + Ферромагнитные протезы клапанов сердца;
- + Фиксирующие конструкции из медицинской стали;
- + Ферромагнитные имплантаты внутреннего уха;
- + Ферромагнитные клипсы на сосудах головного мозга;
- + Инсулиновые помпы;
- + Металлические осколки, попавшие в организм в результате травмы.



## ПОДГОТОВКА К МРТ

### ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ:

- + Первый триместр беременности (только по экстренным показаниям);
- + Клаустрофобия;
- + Невозможность сохранять неподвижное положение во время исследования;
- + Можно проводить исследование через 1,5 месяца после установки:
  - кава-фильтра;
  - кровоостанавливающих клипс (на сосудах легких, в брюшной полости и в тазу);
  - стентов сосудов сердца и почек;
- + Наличие татуировок в зоне исследования, выполненных с помощью красителей с содержанием металлических соединений.

### ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МРТ С КОНТРАСТОМ:

- + Прохождение предшествующего МРТ/КТ/Рентген с контрастом менее 36ч назад, (если иное не оговорено с врачом-рентгенологом);
- + Наличие тяжелых аллергических реакций на контрастный препарат для МРТ;
  - при легких формах аллергических реакций (например зуд), возможно проведение.
  - после премедикации (обязательна предварительная консультация аллерголога).
- + Острая и хроническая почечная недостаточность (СКФ < 30 мл/мин);
- + Беременность – только по экстренным показаниям;
- + При кормлении грудью рекомендовано прекратить вскармливание на 24 часа