



МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:



За 24 – 48 часов исключить газообразующие продукты (бобовые, капуста, виноград, молоко и кисломолочные продукты, жирная и жареная, высококалорийная пища, сдобная выпечка, газированные напитки).



За 3 – 4 часа не принимать пищу, воздержаться от курения.



За 1 час принять 2 таблетки «Но-Шпа» 40 мг.
Опорожнение прямой кишки перед исследованием.
При отсутствии самостоятельного стула – применение микроклизмы «Микролакс» за 1–2 часа до исследования.

ПРИ ПРИЦЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ МАТКИ/ЯИЧНИКОВ):



Исследование выполняется **на 7 – 12 день** менструального цикла. Если проводилось диагностическое выскабливание, то исследование выполняется **через 1,5 месяца после**.

ПРИ ПРИЦЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ:



За 1 час до исследования выпить 500 – 750мл негазированной питьевой воды.

За 1 час до исследования не опорожнять мочевой пузырь.
Если проводилась цистоскопия, то исследование выполняется через 6 – 7 дней после.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВОДИТЬ, ЕСЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 – 36 ЧАСОВ ПРОВОДИЛАСЬ ГАСТРО И/ИЛИ КОЛОНОСКОПИЯ.